



Sprache: Albanisch

MOSHA	(në javë)	Bebet (në muaj)			Të Sapolindurit		Fëmijët (në vjet)			Adoleshentët		Të Rriturit	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	nga 18	nga 60
VAKSINIMI			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tetanos		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	A (çdo 10 vjet, N nëse kërkohet) ^f	
Difteria		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	A (çdo 10 vjet, N nëse kërkohet) ^f	
Kolla e mirë Pertusis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	A ^f (N nëse kërkohet)	
Polio Poliomeliti		G1	G2 ^a	G3	G4	N					A1	N (nëse kërkohet)	
Hepatiti B		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Hib <i>Hemofilus influenza tipi b</i>		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Pneumokokus ^g		G1		G2	G3	N						S ^c	
Rotavirusët	G1 ^b	G2	(G3)										
Meningokokus Serogrupi C					G1 (nga 12 muaj)		N						
Fruthi					G1	G2	N					S ^d	
Shyta Rubela					G1	G2	N						
Lia e dhenve Varicela					G1	G2	N						
Gripi Influenca												S (çdo vit)	
HPV Papilomaviruset e njeriut							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Datat e vaksinave të ardhshme



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

SHËNIME SHPJEGUESE

- G** IMUNITETE BAZË (deri në 4 doza vaksinë G1–G4)
- S** IMUNITETI STANDARD
- A** IMUNITETI ME VAKSINË SUPLEMENTARE
- N** ARRITJA E IMUNITETIT (imunitet bazë për këdo që nuk është vaksinuar akoma ose plotësimi i një serie të papërfunduar me vakcina)
- U** Ekzaminimi i zbulimit të hershëm
- J** Ekzaminimi tek të rinjtë (J1 me moshë 12–14 vjeç)

- a** Kjo dozë nuk kërkohet kur përdorni një vaksinë monovalente.
- b** Vaksinimi i 1-rë duhet të bëhet qysh nga moshë 6 javëshe, varësisht vaksinës që përdoret, të nevojshme janë 2 ose 3 doza në distancë kohore prej të paktën 4 javë.
- c** Vaksinimi i vetëm me Vaksinë-Polisaharide, vaksinimi përtëritës rekomandohet vetëm për indikacione specifike.
- d** Vaksinimi i vetëm për të gjithë personat ≥ 18 vjet, të lindur pas vitit 1970 me vaksinim të panjohur, pa vaksinim ose me vetëm një vaksinim në fëmijëri. Para se gjithash me një vaksinë MMR.

- e** Vaksinim standard për vajzat e moshës 9–13 ose 9–14 vjeç (në varësi të vaksinës së përdorur), për numrin e dozave të vaksinës shikoni informacionet e specializuara!
- f** Td-vaksinimi përtëritës çdo 10 vjet. Td-vaksinimi i ardhshëm i planifikuar si vaksinë e vetme Tdap, ose për indikacionin përkatës si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV.
- g** Fëmijët e lindur përpara kohe marrin një dozë shtesë vaksinimi në moshën tre vjeçare, d.m.th. gjithsej 4 doza.