



تاریخ واکسین های بعدی

سن واکسین	نوزادان (در ماه ها)			کودکان نوپا		اطفال (درسالها)			نوجوانان		بزرگسالان	
	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	18 از	60 از
تیتانوس	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
دیفتری	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
سیاه سرفه پیرتوسیس	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
فلج هیپتائیتس (زردی)	G1	G2 (الف)	G3	G4	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
هپاتیت B	G1	G2 (الف)	G3	G4	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
انفلویزای نوع هموفیلوس بی	G1	G2 (الف)	G3	G4	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
امراض سینه و بقل ①	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
روتا ویروس	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
مرض منجوکوک سیروگروپ سی	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
سرخکان	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
ممیز روبیلا	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
چیچک وریسیلا	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
ریزش انفلویزای	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N
HPV ویروس پاپیلومای انسانی	G1	G2	(G3)	G3	N	A1	A1	N	A1	N	N	N



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- الف) تطبیق این دوره در صورتیکه واکسین مونوالینت تطبیق گردد، لازم نمیشد.
- ب) نخستین دوز واکسین باید از شش هفته اول بعد از تولد تطبیق گردد. نظر به نوع واکسین، تطبیق 2 یا 3 واکسین در وقفه های حد اقل 4 هفته لازم پنداشته میشود.
- ج) دوز منفرد واکسین حاوی واکسین پولی ساکارید و واکسین تقویت کننده صرف در حالاتی که علائم مشخص موجود باشد، توصیه میشود.
- د) برای تمام افراد بالاتر از 18 سال که سوابق واکسین شان معلوم نباشد و کسانیکه پس از سال 1970 بدنیا آمده باشند و واکسین نشده باشند یا فقط یک دور واکسین را در دوره ای طفولیت گرفته باشند، یک دوره واکسین سرخکان، کله چرک و روبیلا (MMR) برایشان توصیه میگردد.
- ه) واکسین استندرد برای دختران سنین 9 الی 13 یا سنین 9 الی 14 (نظر به سوابق واکسین شان). برای معلومات در مورد دوز های واکسین، به معلومات تخصصی در این زمینه مراجعه نمایید.
- و) واکسین تقویت کننده تی دی در هر 10 سال. واکسین بعدی تی دی که معیاد تطبیق آن تکمیل و بحث دوز منفرد تی دی، و بشکل واکسین مرکب تی دی-آی پی وی نشان داده شده باشد.
- ز) نوزادان قبل از وقت، باید در سن سه ماهگی یک دور واکسین اضافی شوند. یعنی در مجموع چهار دوره شود.

یادداشت های تشریحی

G	واکسین مقدماتی (الی 4 دوره های واکسین G1 الی G4)
S	واکسین معیاری یا استندرد
A	واکسین تقویت کننده
N	واکسین های تطبیق نشده (واکسین اشخاصی که تاکنون واکسین نشده باشند. تکمیل نمودن دوره های واکسین ناتکمیل)
U	معاینه و بازدید بمقصد حصول اطمینان از صحت و سلامت طفل
J	بازدید و معاینه بمقصد حصول اطمینان از صحت و سلامت نوجوان (بین سنین 12 الی 14)