

AŞI TAKVİMİ

Sprache: Türkisch

Aşılamaya mümkün olduğu kadar erken başlatılmalıdır. Her yaş grubu ile ilgili aşı testleri yapılabilir. Geçerli yaş grubu aşı testi sonucuna göre eksik olan aşılar hemen yapılmalıdır.

Tavsiyeler: Yetkili Aşı Komisyonu - Ständige Impfkommision (STIKO), 2016/17. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



YAŞ	(hafta)	Bebekler		(ay)	Küçük Çocuklar		Çocuklar			(yıl)	Gençler		Erişkinler	
	6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–17	18 üstü	60 üstü	
	AŞI	U4		U6		U7	U7A/8	U9	U10	J1				
Tetanos		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (her 10 yılda bir veya arayı kapatma aşıları) f				
Difteri		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (her 10 yılda bir veya arayı kapatma aşıları) f				
Boğmaca Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (gerektiğinde, arayı kapatma aşıları) f				
Çocuk felci Polyomiyelit		G1	G2 a	G3	G4	N				A1	N (gerektiğinde, arayı kapatma aşıları)			
Hepatit B		G1	G2 a	G3	G4	N								
Hib Haemophilus influenzae Tip B		G1	G2 a	G3	G4	N								
Pnömonokok g		G1		G2	G3	N	S c							
Rota virüsleri	G1 b	G2	(G3)											
Menengokok Sero grubu C					G1 (12 ay ve üstü)	N								
Kızamık					G1	G2	N						S d	
Kabakulak Kızamıkçık					G1	G2	N							
Suçiçeği Varisella					G1	G2	N							
Grip Enflüanza											S (her yıl)			
HPV Insancıl Papilom Virüsleri											G1 e	G2 e	N e	

Sonraki aşılamaya tarihleri



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

AÇIKLAMALAR

G	TEMEL AŞILAR (4'e kadar kısmi aşılamaya G1-G4)
S	STANDART AŞILAR
A	TEKRARLANAN AŞILAR
N	TELAFI AŞILARI (bütün aşılanmamış veya eksik aşı dizileri için temel aşı programı)
U	Erken tanı araştırmaları
J	Gençler için araştırmalar (J1 12-14 yaşları arasında)

- a Tek değerli aşı kullanıldığında bu dozdan vazgeçilebilir.
- b Birinci aşı altıncı haftadan itibaren yapılmalıdır. Kullanılan aşı maddesine bağlı olarak en az dört haftalık aralıklarla ikinci ve üçüncü dozların uygulanması gerekmektedir.
- c Polisakkarit aşı ile bir defaya mahsus aşılamaya, tekrar aşısı sadece belli endikasyonlarda önerilmektedir.
- d 1970 yılından sonra doğmuş, 18 yaşından büyük ve aşılanma durumu şüpheli olan, aşılanmayan veya çocukluk çağında sadece bir defa aşılanmış tüm bireyler için bir defaya mahsus aşılamaya. Tercihen MMR aşı maddesi ile.

- e 9-13 veya 9-14 yaş arası kız çocukları için standart aşılamaya (kullanılan aşıya bağlı), aşı dozlarının sayısı için aşı takvimine bakınız!
- f Td tekrar aşısı her 10 yılda bir. Bir sonraki Td aşısı ilgili endikasyonda bir defaya mahsus olmak üzere Tdap-IPV kombine aşısı olarak uygulanmalıdır.
- g Erken doğan bebeklere 3 aylıkken ek bir aşı yapılır. Yani toplamda 4 doz alırlar.