



تاریخ واکسیناسیون‌های بعدی

سن	نوزادان (ماه)		بچه‌ها		کودکان (سال)			نوجوانان		بزرگسالان				
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	18	60	
واکسیناسیون	U4		U6		U7		U7A/8		U9		U10		J1	
کزاز	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (هر 10 سال، ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
دیفتری	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (هر 10 سال، ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
سیاه سرفه پرتوسیس	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
فلج اطفال پولیومیلیت	G1	G2 (الف)	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
هیپاتیت B	G1	G2 (الف)	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
هیپ آنفلوانزا هموفیلی نوع ب	G1	G2 (الف)	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
ذات الریه	G1	G2	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
روتا ویروس ها	G1	G2	(G3)		N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
مننژیت سروگروپ س	G1	G2	G1 (از 12 ماهگی)		N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
سرخک	G1	G2	G1	G2	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
اوریون سرخجه	G1	G2	G1	G2	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
آبله مرغان واریسلا	G1	G2	G1	G2	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
فلو آنفلوانزا	G1	G2	G1	G2	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			
HPV ویروس پاپیلوما‌ی انسانی	G1	G2	G1	G2	N	A1	A1	N	A2	A	A (ایمن‌سازی جبرانی در صورت لزوم)			



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- ⓐ هنگام استفاده از واکسن تک ظرفیتی، این دوز لازم نیست.
- ⓑ اولین واکسیناسیون باید از شش هفته‌گی انجام شود. بسته به نوع واکسن، 2 یا 3 دوز در فاصله حداقل 4 هفته لازم است.
- ⓒ واکسیناسیون در یک دوز با واکسن پلی ساکارید، واکسیناسیون پشتیبان فقط برای تجویزهای خاصی توصیه می‌شود.
- ⓓ هنگام استفاده از واکسن تک ظرفیتی، این دوز لازم نیست.
- ⓔ اولین واکسیناسیون باید از شش هفته‌گی انجام شود. بسته به نوع واکسن، 2 یا 3 دوز در فاصله حداقل 4 هفته لازم است.
- ⓕ واکسیناسیون در یک دوز با واکسن پلی ساکارید، واکسیناسیون پشتیبان فقط برای تجویزهای خاصی توصیه می‌شود.
- ⓖ متولدین زود هنگام، یک دوز اضافی واکسن در سن 3 ماهگی، یعنی جمعاً 4 دوز، دریافت می‌کنند.

- ⓐ هنگام استفاده از واکسن تک ظرفیتی، این دوز لازم نیست.
- ⓑ اولین واکسیناسیون باید از شش هفته‌گی انجام شود. بسته به نوع واکسن، 2 یا 3 دوز در فاصله حداقل 4 هفته لازم است.
- ⓒ واکسیناسیون در یک دوز با واکسن پلی ساکارید، واکسیناسیون پشتیبان فقط برای تجویزهای خاصی توصیه می‌شود.
- ⓓ هنگام استفاده از واکسن تک ظرفیتی، این دوز لازم نیست.
- ⓔ اولین واکسیناسیون باید از شش هفته‌گی انجام شود. بسته به نوع واکسن، 2 یا 3 دوز در فاصله حداقل 4 هفته لازم است.
- ⓕ واکسیناسیون در یک دوز با واکسن پلی ساکارید، واکسیناسیون پشتیبان فقط برای تجویزهای خاصی توصیه می‌شود.
- ⓖ متولدین زود هنگام، یک دوز اضافی واکسن در سن 3 ماهگی، یعنی جمعاً 4 دوز، دریافت می‌کنند.

توضیحات

- G** ایمن‌سازی اولیه (در حداکثر 4 دوز واکسن G1-G4)
- S** ایمن‌سازی اصلی
- A** ایمن‌سازی یادآور
- N** ایمن‌سازی جبرانی (ایمن‌سازی اولیه افرادی که واکسیناسیون انجام نداده‌اند یا کامل کردن سری ناقص واکسیناسیون)
- U** معاینه تشخیص زودهنگام
- J** معاینه جوانان (J1 بین 12 تا 14 سال)